

Cetearyl Alcohol & Cetearyl Glucoside

Datum štampanja: 04.09.2024

POSEBNA UPOZORENJA

BEZBEDNOSNE MERE



Oprema za ličnu zaštitu: prilikom upotrebe uvek nositi propisanu opremu za ličnu zaštitu!
Zaštita kože ruku: Nema zahteva pod normalnim uslovima upotrebe. Kod dugotrajnije izloženosti koristiti zaštitne rukavice (SRPS EN 374-2:2016).



Zaštita očiju/lica: Nema zahteva pod normalnim uslovima upotrebe. Ako postoji opasnost od kontakta sa očima, koristite zaštitne naočare.

Zaštita kože drugih delova tela: Nema zahteva pod normalnim uslovima upotrebe. Kod prekomernog izlaganja nosite zaštitnu radnu odeću (kombinezon i cizme). Pamučno zaštitno odelo i zatvorena obuća (SRPS EN ISO 20345:2022).

Zaštita disajnih organa: Prilikom normalne upotrebe i pri odgovarajućem provetranju nije potrebna.

Skladištenje: Čuvati na hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.



Higijenske mere: Voditi računa o ličnoj higijeni – oprati ruke pre odmora i posle rukovanja. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Ne udisati prašinu.

POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE

Postupak čišćenja: Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

Odgovarajuće sredstvo za gašenje: Sredstva za gašenje izabrati prema uslovima u okolini.

Upozoriti i druge osobe!: Pogledati: Lokalni plan protivpožarne zaštite



Pružite prvu pomoć!
Zaštite sebe. Nemojte udisati gas/dim/isparenja/izmaglice.
Posle nezgode sačekajte da nadređeni ili vatrogasci dozvole ponovni pristup radnom mestu.



Obavestiti nadređene!

SIMPTOMI TROVANJA

Posle udisanja:

Posle dodira sa kožom: U kontaktu s kožom može izazvati iritaciju (crvenilo, svrab).

Posle dodira s očima: U dodiru sa očima može izazvati iritaciju (suzenje, crvenilo).

Posle gutanja: Može izazvati mučninu/povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku.

OPIS MERA PRVE POMOĆI

Posle udisanja: Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Kod pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Posle dodira sa kožom: Delove tela koji su došli u dodir s preparatom odmah oprati s puno vode i sapuna. Ako se stanje ne poboljša, potražiti medicinsku pomoć.

Posle dodira s očima: Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Posle gutanja: Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. U slučaju dvoumljenja ili ukoliko se osećate loše, potražiti pomoć lekara. Lekar u pokazati bezbednosni list ili etiketu.

RUKOVANJE OTPADOM

Uklanjanje otpada: Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakoni 35/23): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu otpada (otpadnog materijala).

Cetearyl Alcohol & Cetearyl Glucoside

Datum štampanja: 04.09.2024

Uklanjanje otpadne ambalaže: Potpuno ispražnjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br.36/09, 95/18-dr. zakon i 35/23).
Prilikom odstranjivanja pridržavajte se i internih uputstava.